



WEBINAR PROVOCĂRILE DURERII

Ediția a IV-a

14 Noiembrie 2025

ORGANIZATOR ȘTIINȚIFIC
COLEGIUL MEDICILOR IFLOV

11:30 Forum AIMedical – Puterea AI în mana medicului

Moderator: Conf. Univ. Dr. Florian Berghea

11:30 Elemente de digitalizare a medicinei ApolloAI

Mihaela Onofrei

11:50 Elemente de digitalizare a medicinei Dr.online

Iulius Nistor

12:00 De la digital la clinic – deschiderea sesiunii clinice

Moderator: Conf. Univ. Dr. Florian Berghea, Spitalul Clinic “Sf. Maria” București

12:10 Noutăți în înțelegerea și managementul durerii în 2025

Conf. Univ. Dr. Florian Berghea, Spitalul Clinic “Sf. Maria” București

12:30 De la inflamație la fibromialgie: provocările durerii în lupusul eritematos sistemic

Prof. Univ. Dr. Andra Bălănescu, Spitalul Clinic “Sf. Maria” București

12:50 Durerea musculară - de la miozite la polimialgie

Prof. Univ. Dr. Mihai Bojincă, Spitalul Clinic “Dr. I. Cantacuzino” București

13:10 Simpozion Gedeon Richter: Dincolo de durere: valoarea clinică a Aceclofenac între ghiduri și realitate

Prof. Univ. Dr. Andra Bălănescu, Spitalul Clinic “Sf. Maria” București

13:30 Sesiune Q&A

13:40 Durerea în bolile reumatice: dimorfism sexual și implicații terapeutice

Conf. Univ. Dr. Daniela Opreș-Belinski, Spitalul Clinic “Sf. Maria” București

14:00 Umărul dureros - cum putem naviga printre diagnostice?

Conf. Univ. Dr. Violeta Bojincă, Spitalul Clinic “Sf. Maria” București

14:20 Durerea în cabinetul de ecografie musculoscheletala

Conf. Univ. Dr. Florian Berghea, Spitalul Clinic “Sf. Maria” București

14:40 Simpozion Berlin-Chemie: Analgezia multimodală, între expertiza clinicianului și interpretarea IA

Conf. Univ. Dr. Florian Berghea, Spitalul Clinic “Sf. Maria” București

15:10 Sesiune Q&A

15:20 Durerea toracică în bolile pulmonare: între simptom și semnal de alarmă

Prof. Univ. Dr. Claudia Toma, Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” București

15:40 Durerea în neuropatia diabetică – elemente de actualitate

Conf. Univ. Dr. Anca Pantea-Stoian, Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „N.C.Paulescu” București

16:00 Simpozion Haleon: Managementul durerii musculoscheletale

Conf. Univ. Dr. Florian Berghea, Spitalul Clinic “Sf. Maria” București

16:30 Să înțelegem durerea neuropată - abordări diagnostice și terapeutice moderne

Dr. Vasile Mihai, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" București

16:50 Durerea abdominală din perspectiva gastroenterologului

Prof. Univ. Dr. Georgeta-Carmen Fierbințeanu-Braticevici, Spitalul Universitar de Urgență București

17:10 Cum moduleaza subconștientul percepția durerii?

Prof. Univ. Dr. Dana Craiu, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”

17:30 Simpozion Terapia: Vertijul acut, o provocare de diagnostic și tratament

Dr. Vasile Mihai, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" București

18:00 Opțiuni terapeutice noi în migrenă

Dr. Florin Scărlătescu, Spitalul Clinic de Urgență (Floreasca) București

18:20 Evaluarea durerii prin instrumente AI

Conf. Univ. Dr. Florian Berghea, Spitalul Clinic "Sf. Maria" București

18:40 Concluzii și privire spre viitor

Conf. Univ. Dr. Florian Berghea, Spitalul Clinic "Sf. Maria" București

19:00 Închiderea webinarului




SKUDEXA[®]

Tramadol Hydrochloride + Dexketoprofen

75 mg/25 mg

Analgezie multimodală eficientă și reducere rapidă a durerii acute¹⁻⁴



Analgezic opioid/AINS^{5, 6}

Combinație în doză fixă cu administrare orală^{5, 6}

Pentru tratamentul durerii acute
moderate până la severe^{5, 6, *}

* tratament simptomatic, pe termen scurt, până la 5 zile



**Doza recomandată este de 1 comprimat
filmă/1 plic cu granule pentru soluție orală**

(echivalent la clorhidrat de tramadol 75 mg și dexketoprofen 25 mg)

până la maxim 3 comprimate / 3 plicuri pe zi

(echivalent la clorhidrat de tramadol 225 mg și dexketoprofen 75 mg).

Intervalul minim între doze: 8 ore. Skudexa este destinat numai administrării pe termen scurt, nu mai mult de 5 zile.

¹ Moore RA, McQuay HJ, Tomaszewski J, Raba G, Tutunaru D, Lietuviene N, et al. BMC Anesthesiol. 2016 ian 22; 16:9.

Studiu multicentric, randomizat, dublu-orb, cu grupuri paralele, controlat placebo și activ, cu doză unică și doze multiple, de fază III, pe un număr de 606 pacienți cu histerectomie totală sau parțială pentru afecțiuni benigne, prezentând dureri de intensitate moderată și severă (VAS ≥ 40). Paciente urmas să primească șapte doze consecutive din medicamentul studiului, pe o perioadă de 3 zile. Obiectivul principal de eficacitate îl reprezintă SPID8 (suma diferențelor de intensitate a durerii la 8 h).

² McQuay HJ, Moore RA, Berta A, Gainutdinovs O, Fülesdi B, Porvaneckas N, et al. Br J Anaesth. 2016 feb; 116(2):269-76.

Studiu multicentric, randomizat, dublu-orb, cu grupuri paralele, controlat placebo și activ, de fază III, cuprinzând o fază cu doză unică și o fază cu doze multiple. Au fost cuprinși 641 de pacienți supuși unor intervenții standard de artroplastie totală de șold primară unilaterală pentru osteoartrită și care acuzau în repaus dureri de intensitate cel puțin moderată (VAS ≥ 40) în ziua de după intervenție. Medicamentul de studiu a fost administrat pe cale orală, o dată la 8 h pe o perioadă de 5 zile. Obiectivul principal de eficacitate îl reprezintă SPID8 (suma diferențelor de intensitate a durerii la 8 h).

³ Moore RA, Gay-Escoda C, Figueiredo R, Tóth-Bagi Z, Dietrich T, Miller S, et al. J Headache Pain. 2015; 16:60.

Studiu multi-centric, randomizat, dublu-orb, cu grupuri paralele, controlat placebo și activ, de fază II, cu un total de 10 grupe de tratament, cu dexketoprofen trometamol (DKP [12,5 mg și 25 mg]) și clorhidrat de tramadol (TRAM [37,5 mg și 75 mg]) administrate sub formă de componente unice și în patru combinații fixe diferite, un grup maror activ (ibuprofen 400 mg), pe 606 pacienți cu durere moderată și severă (scala analog vizuală [VAS] ≥ 40 mm și scala de evaluare verbală cu 4 puncte [VRS] ≥ 2). Obiectivul studiului a fost acela de a evalua eficacitatea analgezică superioară și tolerabilitatea fiecărui agent unic și a fiecărei combinații față de placebo. Obiectivul primar a fost reprezentat de proporția pacienților cu cel puțin 50% din reducerea totală maximă a durerii. TOTPAR max. pe un interval de 6 ore după administrarea dozei (≥ 50% TOTPAR max).

⁴ Gay-Escoda C, Hanna M, Montero A, Dietrich T, Miller S, Giergiel E, et al. BMJ Open. 2019 Feb 19; 9(2):e023715. doi: 10.1136/bmjopen-2018-023715. Studiu de fază IIIb multicentric, randomizat, dublu-orb, controlat placebo și activ, pe 653 de pacienți sănătoși cu vârsta de minimum 18 ani programați pentru extracția pe cale chirurgicală a cel puțin unui molar 3 inferior complet sau parțial impactat. Participanților cu durere moderată și severă [≥ 4 pe o scară de evaluare numerică (NRS) cu 11 puncte] la patru ore de la intervenție, li s-a administrat oral o doză unică de tramadol/dexketoprofen 75 mg/25 mg (n = 260), tramadol/paracetamol 75 mg/650 mg (n = 262) sau placebo (n = 131). Obiectivul primar l-a constituit TOTPAR6 (reducerea totală a durerii la șase ore de la administrarea dozei).

⁵ Skudexa[®], comprimate filmate, RCP, Mai 2022


⁶ Skudexa[®], granule pentru soluție orală, RCP, Octombrie 2022

Acest medicament se eliberează pe bază de prescripție medicală PS.

Pentru informații suplimentare consultați RCP-ul medicamentului.

Acest material este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății.





- ✓ Ameliorează durerea
- ✓ Reduce inflamația
- ✓ Grăbește vindecarea




**Reduce durerea în
60 de minute*¹**



**Răcește cu 5°C în
3 minute²**



**50% mai rapid
Recuperare vs placebo¹**



*Durere la mișcare în cazul durerii acute de gât

1. Predel HG et al. BMC Musculoskelet Disord. 2013;14:250.

2. Hug AM et al. Skin Res Technol. 2012;18(2):199-206

Medicament care se poate elibera fără prescripție medicală. Acest medicament conține diclofenac. Acest material promoțional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății. Eventualele reacții adverse se pot raporta la SafetyReportingEMEA@haleon.com. Voltaren ActiPro 11,6 mg/g gel. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI: Februarie 2021. DATA REVIZUIRII TEXTULUI: Noiembrie 2024. Pentru informații suplimentare despre medicamente consultați Rezumatul Caracteristicilor Produsului sau vă puteți adresa la Haleon România SRL, Opera Center 1, Str. Costache Negri, Nr. 1-5, București, tel. 0213028208.

AFLAMIL[®]
aceclofenac 100 mg



SIGURANȚĂ^{1,2}



**EFFECT ANTIINFLAMATOR
ȘI ANALGEZIC¹**



LIBERTATE DE MIȘCARE³

**O CALE MAI SIGURĂ
CĂTRE MOBILITATE**

**ACECLOFENAC – eficient în managementul durerii²
și cu cele mai puține evenimente adverse severe
raportate* dintre AINS studiate.⁴**

Referințe: **1.** RCP Aflamil 100 mg comprimate filmate; **2.** Iolascon G, et al. J Pain Res. 2021;14:3651-3663. doi: 10.2147/JPR.S326101; **3.** Kornasoff D, et al. Clin Rheumatol. 1997 ;16(1):32-8. doi: 10.1007/BF02238760; **4.** Lapeyre-Mestre M, et al. Fundam Clin Pharmacol. 2013;27(2):223-30. doi: 10.1111/j.1472-8206.2011.00991.x.

Acest material este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați rezumatele caracteristicilor produselor. Aflamil 100 mg comprimate filmate este un medicament care conține aceclofenac și se eliberează pe bază de prescripție medicală. Data ultimei reînnoiri a autorizației: martie 2014. Aflamil 100 mg pulbere pentru suspensie orală în plic este un medicament care conține aceclofenac și se eliberează pe bază de prescripție medicală. Data ultimei reînnoiri a autorizației: septembrie 2019. Deținătorul autorizațiilor de punere pe piață: Gedeon Richter România S.A., Str. Cuza Vodă Nr. 99-105, 540306 Târgu-Mureș, România. Pentru mesaje de siguranță sau pentru informații medicale: telefon: +40265257011 sau email: pharmacovigilance@gedeon-richter.ro www.gedeonrichter.com/ro/ro



GEDEON RICHTER



PARTENERI PLATINUM



BERLIN-CHEMIE
MENARINI

HALEON

PARTENERI BRONZE



GEDEON RICHTER

Terapia
a SUN PHARMA company

ORGANIZATOR LOGISTIC



Sundry
ADVERTISING & COMMUNICATION